

# LIDOVAP-2%®

## Komposisi :

Setiap 1 ml mengandung :

Lidocain HCl ..... 20 mg

## Indikasi :

Sapi, babi, kambing/domba, anjing dan kucing.  
Dosis tergantung pada ukuran hewan dan aplikasi anaestesi

## Dosis :

### Epidural:

sapi (5-15 ml),  
anjing dan kucing (1 ml/5 kgBB),  
sapi perah, domba, dan kambing (3-10 ml).

Blokade saraf: sapi (5-20 ml).

### Infiltrasi :

Local anestesi dengan aplikasi SC dan IM dengan melarutkannya pada konsentrasi 0,5% (1 ml dari Lidovap 2% larutan diencerkan dengan 3 ml aquades steril) :

sapi : 5 - 100 ml,  
babi : 60 - 80 ml (untuk laparotomi),  
anjing : 2 - 10 ml (caudektomi : 0,5 – 5 ml),  
kucing: 0,5 - 4 ml (bedah minor aplikasi SC).

### Waktu henti obat :

Tidak dilakukan pemotongan dan pemerahan selama 5 hari pasca pemberian obat.

### Peringatan

- Jangan diberikan secara IntraVena (IV).
- Jangan diberikan kepada hewan yang memiliki hipersensitifitas terhadap zat aktif obat.
- Lidocain pada umumnya memiliki toleransi yang baik, akan tetapi terkadang memberikan efek samping yang merugikan pada hewan yang memiliki hipersensitifitas, teknik pemberian dan dosis obat yang salah.
- Shock, konvulsi dan perasaan mengantuk akan terjadi ketika diberikan dosis yang tinggi secara IV, segera berikan preparat barbiturate agar dapat mengontrol stimulasi sistem saraf dan berikan pernafasan buatan ataupun oksigen.
- Jika mengalami kesulitan bernafas, berikan secepatnya pernafasan buatan atau pemberian oksigen.
- Anasthesi epidural tidak direkomendasikan untuk anjing.
- Jauhkan dari jangkauan anak kecil
- Simpan ditempat sejuk(15-25<sup>0</sup>C),kering dan terhindar dari sinar matahari langsung.

## KEMASAN :100 ml

OBAT HANYA UNTUK HEWAN  
HARUS DENGAN RESEP DOKTER HEWAN



Diproduksi oleh :

Veterinary & Agricultural Products  
Manufacturing Co. Ltd.  
YORDANIA



Didistribusikan oleh :

PT. MITRAVET  
INDONESIA



**KEMENTAN RI No. I.14044818 PKS**