

VAPCOGENT-10%®

Komposisi :

Setiap 1 ml mengandung :

Gentamisin Sulfat 100 mg

Indikasi :

Untuk sapi, babi, kambing/domba, anjing dan kucing, serta unggas, :

- Pada saluran pernapasan mampu menanggulangi bronchitis, pneumonia, tonsilitis, dan trakheitis,
- Pada saluran pencernaan mampu mengatasi gastritis, peritonitis, enteritis, diare, dan desentteri.
- Pada saluran urinary mampu mengatasi nefritis, uretritis, dan sistitis.
- Pada saluran reproduksi mampu mengatasi metritis, peradangan serviks dan mastitis.
- Mampu mengatasi septicemia, gangguan kulit, dan arthritis.
- Mengurangi kematian neonatal, hewan muda, sebelum sapih, dan unggas muda.



KEMENTAN RI No. I.14044795 PKC

Dosis :

IntraMuscular (IM) :

Ruminansia : 1-2 ml/50 kgBB (2-4 mg/kgBB),

Berikan dua kali sehari selama 5 – 10 hari.

Anjing, kucing dan babi : 0,5 ml/10kgBB (5 mg/kgBB).

Dosis di hari pertama diberikan dua kali, hari berikutnya satu sehari dan tidak boleh diberikan lebih dari 7 hari.

Unggas : larutkan dengan larutan salin fisiologis atau air steril dengan pengenceran 1:5 kemudian suntikan 0,25 ml/kgBB (5 mg/kgB).

Berikan dua kali sehari selama 5 – 10 hari.

IntraUterine (IU) (untuk kasus metritis dan peradangan serviks) :

Sapi : 2 ml dilarutkan dalam 20-50 ml salin fisiologis kemudian bilaskan ke uterus,

Pada kasus pyometra, eksudatnya harus dihilangkan terlebih dahulu dari uterus. Jangan diberikan pada masa birahi.

SubCutaneous (SC) (diberikan di leher) :

DOC : larutkan dengan larutan salin fisiologis atau air steril dengan pengenceran 1:100 kemudian suntikan 0,2 ml/ayam.

PerOral (PO) :

Unggas : 1 ml/1 liter air minum, berikan selama 4-5 hari.

Waktu henti obat :

Temak tidak boleh dipotong untuk konsumsi 45 hari setelah pengobatan terakhir dan susu tidak boleh dikonsumsi 5 hari setelah pengobatan

Peringatan

- Jangan diberikan bersamaan dengan preparat anestetik general, relaksasi otot dan antibiotic golongan aminoglycosida atau polymixins (colistin).
- Jangan diberikan kepada hewan yang memiliki gangguan ginjal.
- Memiliki efek samping : nephrotoxicity, ototoxicity dapat terjadi di kucing.
- Simpan ditempat sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung

KEMASAN :100 ml

OBAT HANYA UNTUK HEWAN
HARUS DENGAN RESEP DOKTER HEWAN



Diproduksi oleh :

Veterinary & Agricultural Products
Manufacturing Co. Ltd.
YORDANIA



Didistribusikan oleh :

PT. MITRAVET
INDONESIA