

VAPCOTRIM®

Komposisi :

Setiap 1 ml mengandung :

Trimethoprim 40 mg
Sulphadiazine Na 200 mg



KEMANTAN RI No. I.14054831 PKC

Dosis :

Ruminansia dan babi : 1 ml/16 KgBB, IM,

Unggas : 0,2 ml/KgBB, IM

Anjing dan kucing : 1 ml/8 KgBB, SC.

Pengobatan dapat diulang dalam jangka waktu 3-5 hari

Waktu henti obat :

Ternak tidak boleh dipotong untuk konsumsi 10 hari dan untuk kambing selama 18 hari setelah pengobatan terakhir. Ternak penghasil susu, perahan susu tidak boleh dikonsumsi selama 3 hari setelah pengobatan

Peringatan

- Simpan ditempat sejuk,kering dan terhindar dari sinar matahari langsung
- Jauhkan dari jangkauan anak kecil
- Dapat menyebabkan kontraindikasi pada hewan yang memiliki gangguan hati dan ginjal.
- Berikan asupan air yang cukup pada pasien, untuk mencegah terjadinya kristalluria.
- Tidak boleh diberikan bersamaan dengan preparat flumequine.

KEMASAN : 100 ml

OBAT HANYA UNTUK HEWAN

HARUS DENGAN RESEP DOKTER HEWAN



Diproduksi oleh :

**Veterinary & Agricultural Products
Manufacturing Co. Ltd.
YORDANIA**



Didistribusikan oleh :

**PT. MITRAVET
INDONESIA**